

子どもの予防接種

持ち物

母子健康手帳、予診票
バスタオル

【保護者の同伴について】 13歳未満の場合、予防接種には原則として保護者が付き添ってください。保護者が付き添えない場合、接種するお子さんの健康状態をよく知る人が付き添ってください。その場合、予診票に加え、委任状が必要となります。

接種ワクチン (予防する病気)	ロタウイルス ロタリックス ロタテック (ロタウイルス胃腸炎)	B型肝炎 (B型肝炎)	ヒブ (ヒブ感染症)	小児用肺炎球菌 13価結合型 (小児の肺炎球菌感染症)	四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ)	BCG (結核)	水痘 (水ぼうそう)	麻疹・風疹混合 (はしか、風疹)	日本脳炎 (日本脳炎)
接種対象 年齢	生後6週0日～ 24週0日	生後6週0日～ 32週0日	1歳未満		生後2か月～5歳未満	生後3か月～ 7歳6か月未満	1歳未満	1歳～ 3歳未満	3歳～ 7歳6か月未満
接種間隔 及び回数	2か月～24週 0日に27日以上の 間隔をおいて2回	2か月～32週 0日に27日以上の 間隔をおいて3回	【1回目と2回目】 27日以上の間隔をおく 【3回目】 1回目から139日 以上の間隔をおく	【初回(3回)】 2か月～7か月未満に 27～56日間隔をおい て3回 【追加(1回)】 初回3回目から 7か月～13か月の間 隔をおいて1回	【初回(3回)】 2か月～7か月未満に 27日以上の間隔をおい て3回 【追加(1回)】 初回3回目から 60日以上あけ、生後12 か月～15か月の間に1 回	【1期初回(3回)】 3か月～1歳未満に 20～56日間隔をおい て3回 【1期追加(1回)】 1期初回3回目から 12か月～18か月の 間隔をおいて1回	標準は生後 5か月～8 か月未満の 間に1回	【1回目】 生後12か月～ 15か月の間に 1回 【2回目】 1回目から6 か月～12か月の 間隔をおく	【第1期(1回)】 生後12か月～24か 月未満に1回 【第2期(1回)】 平成28年4月2日～ 平成29年4月1日生 まれ
	※初回接種は2か月から 生後14週6日までに行う								
ワクチン の種類	経口生ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	注射生 ワクチン	注射生 ワクチン	注射生ワクチン	不活化ワクチン
接種場所	委託医療機関					中野保健 センター	委託医療機関		中野保健センター
注意事項	◎原則として、同一のワクチンで接種を完了してください。	◎出生後母子感染予防のためにB型肝炎ワクチンの接種を受けている場合は、定期接種の対象にはなりません。	◎接種回数は開始月齢・年齢毎に異なります。詳しくは、お問い合わせください。			◎予診票は3か月児健診でお渡しします。	◎予診票は7か月児健診でお渡しします。 ◎水痘にかかったことがある方は接種できません。	◎第1期の予診票は7か月児健診でお渡しします。 ◎第2期の対象の方には個別に通知します。 ◎原則として、麻疹風疹混合ワクチンを接種します。	◎対象の方には個別に通知をします。 ◎生後6か月～3歳未満でも予防接種が出来ます。流行地域へ渡航される等の場合はお問い合わせください。
◎生後1か月以内に、予診票を送付いたします。									

〈中野保健センター実施日程〉 3日前までに事前予約が必要です。(実施予定者数になりましたら、希望日の変更をお願いする場合があります)

接種ワクチン	受付時間	実施日程							
BCG	午後1時～1時30分	4月12日(火)	6月6日(月)	7月11日(月)	9月13日(火)	10月11日(火)	12月12日(月)	1月10日(火)	3月7日(火)

県外、市外での予防接種をご希望される方は健康づくり課母子保健係までお問い合わせください。

予防接種を受けた後で大切なこと

- ・ 予防接種を受けた 30 分間は接種会場でお子さんの様子を確認するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがあります。
- ・ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- ・ 当日は、はげしい運動はさげましょう。



長期療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けられなかった方へ

長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたなどの「特別な事情」により、定期予防接種の対象年齢の間、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、予防接種を受けることができるようになってから 2 年の間（ただし、高齢者肺炎球菌は 1 年の間）、公費負担で接種を受けることができます。

この接種の対象となり、接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に健康づくり課に申請をして下さい。詳しくは健康づくり課母子保健係にお問い合わせください。

けいれん（ひきつけ）について

「熱性けいれん」と診断された場合は、最終発作から 2～3 か月の観察期間をおけば実施できます。主治医の判断でその期間を短縮する場合は、母子健康手帳の余白に証明（医療機関名、医師名及び押印）をいただいでください。（証明がないと、接種できません。）

病気と予防接種との間隔

りんご病、手足口病、突発性発疹・ウイルス性疾患	おたふくかぜ、風しん、水ぼうそう	麻しん
治ってから 1～2 週間で受けられます。	治ってから 2～4 週間程度で受けられます。	治ってから 4 週間以上で受けられます。

令和 4 年度 子ども インフルエンザ 予防接種助成事業

- ・ 対象者：平成 19 年 4 月 2 日以降に生まれた、生後 6 か月から 15 歳（中学 3 年生）まで
- ・ 助成額：1 人 1 回につき、接種金額の 1/2 の金額（上限 1,000 円）2 回まで
- ・ 接種医療機関：中野市内の実施医療機関のほか、市外医療機関での接種も可能です。
※市外医療機関で接種される場合は、必ず事前に健康づくり課窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

中野市子育て世代包括支援センター

お子様のことやご自身のこと 悩んでいませんか？

育児で疲れて
イライラしたり
落ち込んだり…
私の子育てこれで
いいの？

子どもの預け先
や遊び場は
ないかしら…

こどもの発達の
ことが心配で…

育児中の経済状況
に不安がある

どなたでもお気軽にご相談ください。

妊娠・出産・子育てについてのワンストップ相談窓口です。母子保健コーディネーター（保健師）が、各支援機関と連携して、切れ目のない包括的な支援を提供します。

★令和 4 年度から、子ども・子育て支援サービス「なかの子育て応援アプリ」の配信を始めます！
妊娠から子育てまでの情報をタイムリーにお届けします。



ぜひ登録してみてくださいね！

予防接種スケジュール

接種可能な期間

接種推奨期間

ワクチン		乳児期									幼児期					学童期												
		生後直後	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9～11か月	12～15か月	16～17か月	18～23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
ロタウイルス	経口生		①	②																								
	経口テック		①	②	③																							
B型肝炎	不活化		①	②				③																				
ヒブ	不活化		①	②	③						④																	
小児用肺炎球菌	不活化		①	②	③						④																	
四種混合	不活化			①	②	③					④																	
BCG	生					①																						
麻しん・風しん	生										①						②											
水痘	生										①		②															
日本脳炎	不活化													① ②	③							小4・5 ④						
二種混合	不活化																						小6①					
子宮頸がん	不活化																									中1 ①② ③		

初回接種は生後 14 週 6 日までに行いましょう

※接種回数は接種開始の月齢・年齢毎に異なります。詳しくは、お問い合わせください。

小学校入学前の 1 年間

子宮頸がんについては 7 ページ参照

接種間隔について

- ・生ワクチン（BCG・麻しん風しん・水痘・おたふくかぜ）同士の間のみ 27 日以上空けてください。
- ・新型コロナワクチンを接種する場合は前後 2 週間は他の予防接種はできません。

日本脳炎予防接種の特例について

日本脳炎の 1 期 3 回・2 期 1 回のうち未接種分を下記の対象者については公費で接種を受けることができます。ご希望の方は健康づくり課母子保健係へお問い合わせください。

- ・平成 14 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方：20 歳未満までの間
- ・平成 20 年 4 月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日生まれの方：13 歳未満までの間